

# FareWellDock



## Mozzamento e morsicatura della coda: conseguenze dolorose?

### Conoscenza scientifica esistente

Il mozzamento della coda e' una pratica applicata ai suinetti per ridurre il rischio di morsicatura; piu' corta e' la porzione restante di coda piu' basso e' il rischio di morsicamento. Tuttavia il mozzamento della coda anche in suinetti molto giovani causa dolore acuto e conseguente infiammazione prima che si verifichi la guarigione. Per questo motivo l'attuale legislazione dell'Unione Europea stabilisce che il mozzamento debba essere impiegato solamente in assenza di soluzioni efficaci nella prevenzione della morsicatura della coda. Sebbene l'evidenza non sia conclusiva, il mozzamento di una piu' ampia porzione della coda puo' causare maggior dolore nelle ore successive alla procedura. Il trattamento con anestetici locali puo' ridurre il dolore durante il mozzamento, ma ne' questo ne' l'iniezione di antinfiammatori si dimostra efficace contro il dolore nelle ore successive. Il tentativo di ricrescita delle terminazioni nervose recise causa la formazione di un groviglio (neuroma), che puo' essere associato ad un aumento della sensibilita' e del dolore successivamente alla guarigione dall'infortunio. Attualmente non si conoscono gli effetti a lungo termine del mozzamento di porzioni di coda di diverse lunghezze.

### Nuove osservazioni da FareWellDock

Il mozzamento della coda riduce di quattro volte il rischio di morsicamento.

Il mozzamento causa dolore ai suinetti.

Trattamenti per la riduzione del dolore, come ad esempio la somministrazione di meloxicam, possono attenuare ma non eliminare la reazione fisiologica da stress al mozzamento.

Suinetti sottoposti al mozzamento della coda appaiono piu' timorosi nei confronti degli umani rispetto ad animali non soggetti alla pratica.

Nelle code mozzate non si evincono differenze di sensibilita' otto settimane dopo la procedura. Tuttavia, cambiamenti nella funzionalita' dei nervi della coda possono essere osservati anche quattro mesi dopo il mozzamento, il che suggerisce la possibile presenza di dolore a lungo termine.

### Raccomandazioni pratiche

Evitare il mozzamento della coda, qualora possibile, in quanto causa di dolore, di cambiamenti a lungo raggio della funzionalita' dei nervi sensitivi e di possibili conseguenze sulla familiarita' dei suini nei confronti degli umani.

Evitare la morsicatura della coda e la necessita' del mozzamento occupandosi dei fattori di rischio nell'allevamento.

Medicare tempestivamente i suini soggetti alla morsicatura della coda e prendere in considerazione come alleviare il dolore.

**Maggiori informazioni— FareWellDock Website:** [www.farewelldock.eu](http://www.farewelldock.eu)

